

Liste des taxons recoltés le 26 Juillet 2017 à Seytroux

Taxons recensés

68 taxons ont été recensés, certains sur plusieurs secteurs. Si quelques grands genres emblématiques sont absents (ils apparaîtront plus tard en saison), on remarquera la vigueur des russulales, presque toutes des russulacées, partenaires ectomycorhiziens des essences ligneuses et qui jouent ainsi un rôle primordial dans la dynamique forestière.

En ce qui concerne la présentation nous déclinons la DIVISION, l'ORDRE puis l'**espèce**, avec usage général de l'ordre alphabétique. Pour la localisation nous utiliserons les abréviations suivantes :

HC : Hautes Culées LM : les Mouillettes PC : Pointe du Clocher LR : Les Replats

Trait d'union : par exemple HC-LM indique qu'on se trouve entre les Hautes Culées et les Mouillettes.

Abondance : nous indiquerons simplement entre parenthèses TC (très commun) lorsqu'une espèce semble localement dominante, et C (commun) lorsqu'elle est fréquente. Une précision concernant le milieu ou le substrat peut-être apportée.

ASCOMYCOTA

RHYTISMATALES

Spathularia alpestris (Rehm) Rahm LM-PC (C), PC-LR (C)

BASIDIOMYCOTA

AGARICALES

Agaricus augustus Fr. PC-LR

Amanita excelsa var. **spissa** Neville & Poumarat PC-LR (C)

Amanita muscaria f. **flavivolvata** (Singer) Neville & Poumarat LM-PC

Amanita rubescens Pers. LM-PC

Bolbitius titubans var. **vitellinus** (Pers.) Courtec. PC-LR (sur bouse, en lisière)

Clitocybe costata Kühner & Romagn. LR

Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. HC-LM (C), PC-LR

Clitopilus prunulus (Scop.) P. Kumm. HC-LM

Collybia confluens (Pers.) P. Kumm. HC-LM, LM, LM-PC

Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm. LM

Conocybe fuscimarginata (Murrill) Singer HC-LM (C sur bouses, en forêt), PC-LR (id., moins fréquent)

Entoloma cetratum (Fr.) M. M. Moser PC-LR

Hygrophorus erubescens (Fr.) Fr. HC-LM

Hymenopellis radicata f. **marginata** (Konrad & Maubl.) R. H. Petersen PC-LR

Hypholoma radicosum J. E. Lange PC-LR

Inocybe bongardii (Weinm.) Quél. LM

Inocybe xanthomelaena Kühner & Boursier LM-PC

Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer & A. H. Sm. PC-LR (sur bois méconnaissable semi-enterré)

Marasmiellus perforans (Hoffm.) Antonín, Halling & Noordel. HC-LM (C), LM

Marasmius rotula (Scop.) Fr.

Mycena pura (Pers.) P. Kumm. LM, PC-LR

Panaeolus sphinctrinus (Fr.) Quél. PC (C, dans l'herbe)

BOLETALES

Boletus aestivalis (Paulet) Fr. PC-LR

Boletus badius (Fr.) Fr. PC-LR

Boletus calopus Pers. PC-LR

Boletus erythropus Pers. PC-LR

Boletus fechtneri Velen. LM-PC

CANTHARELLALES

Cantharellus cibarius Fr. LM-PC

Cantharellus subpruinus Eyssart. & Buyck LM (C), PC-LR

Hydnum repandum L. LM-PC

DACRYMYCETALES

Calocera viscosa (Pers.) Fr. LM-PC

Dacrymyces stillatus Nees LM-PC (sur bois de conifère)

Ditiola pezizaeformis (Lév.) D. A. Reid HC-LM (sur bois non identifié)

GEASTRALES

Geastrum minimum Schwein. HC-LM

GOMPHALES

Gomphus clavatus (Pers.) Gray LM-PC

Ramaria bataillei (Maire) Corner PC-LR

Ramaria flava (Schaeff.) Quél. HC-LM

Ramaria pallida Maire LM-PC

POLYPORALES

Climacocystis borealis (Fr.) Kotl. & Pouzar PC-LR (sur bois de *Picea*)

Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. LM-PC (sur *Picea* tombé)

Polyporus leptcephalus (Jacq.) Fr. PC-LR (sur bois non identifié)

Postia stiptica (Pers.) Jülich, PC-LR (base tronc vivant *Picea*)

RUSSULALES

Lactarius acris (Bolton) Gray HC-LM

Lactarius deterrimus Gröger HC-LM, LM-PC, PC-LR

Lactarius intermedius (Krombh.) Berk. & Broome LM-PC

Lactarius pallidus Pers. LM

Lactarius picinus Fr. PC-LR

Lactarius salmonicolor Heim & Leclair HC-LM

Lactarius scrobiculatus (Scop.) Fr. HC-LM

Lactarius zonarioides Kühner & Romagn. PC-LR

Lentinellus cochleatus (Pers.) P. Karst. LM

Russula acrifolia Romagn. LM-PC

Russula cyanoxantha (Schaeff.) Fr. PC-LR

Russula cyanoxantha f. **peltereaui** Singer LM (C)

Russula delica Fr. LM

Russula integra (L.) Fr. HC-LM (C), LM (TC), PC-LR (TC)

Russula integra f. ***purpurella*** (Singer) Romagn. ex Bon LM, PC-LR (C)

Russula integra var. ***oreas*** Romagn. HC-LM, PC-LR

Russula nauseosa (Pers.) Fr. LM (dans l'herbe en bordure de formation tendance mégaphorbiaie)

Russula olivacea (Schaeff.) Fr. HC-LM, LM (TC), PC-LR

Russula olivacea var. ***pavonina*** (Bres.) Reumaux ex Reumaux LM (C), PC-LR

Russula olivascens Fr. LM-PC

Russula raoultii Qué. LM

Russula steinbachii Cern. & Singer PC-LR

THELEPHORALES

Hydnellum caeruleum (Hornem.) P. Karst. LM-PC

Hydnellum peckii Banker HC-LM

Hydnellum suaveolens (Scop.) P. Karst. HC-LM, LM-PC